

PROVA N° 3 – CON SOLUZIONI

Domanda 1. Nel colloquio con un familiare in lutto anticipatorio per la perdita del proprio caro possono essere utili affermazioni come:

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | "bisogna essere contenti per la vita che il suo caro ha già vissuto" |
| B | "è stato fortunato ad arrivare sano a questa età" |
| C | "non posso immaginare come si può sentire, ma percepisco quanto forte è il vostro legame" |
| D | "pensi ai momenti belli" |

Domanda 2. Quale scala di valutazione tra quelle riportate valuta lo stato nutrizionale nell'anziano?

| | |
|---|--------------|
| A | Barthel |
| B | MNA |
| C | Braden |
| D | Norton-Exton |

Domanda 3. In quale di queste situazioni l'infermiere deve provvedere a un monitoraggio stretto per il rischio grave di disidratazione:

| | |
|---|--------------------------------------------------------|
| A | Persona con febbre 38°C |
| B | Persona con una glicemia capillare di 40mg/dl |
| C | Persona con sincope |
| D | Persona in coma iperosmolare non chetoacidotico |

Domanda 4. Una residente deve assumere 1 cp di Fosamax (alendronato) 1 volta in settimana per il trattamento dell'osteoporosi. Quali accorgimenti è necessario prevedere:

| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Assunzione del farmaco prima del riposo quotidiano con un bicchiere di acqua |
| B | Assunzione del farmaco durante il pranzo, dopo masticazione della compressa e un bicchiere di acqua |
| C | Assunzione del farmaco in posizione eretta/seduta con un bicchiere di acqua e mantenimento della postura post assunzione per almeno 30 minuti |
| D | Assunzione del farmaco mentre è a letto semiseduta con un bicchiere di acqua |

Domanda 5. Da alcuni giorni il sig. Mario lamenta dispnea per sforzi lievi (ad esempio uscire dal letto e recarsi in bagno); inoltre di notte si sveglia spesso con episodi di tosse insistente che non lo lasciano dormire e quindi a letto ha messo un altro cuscino per respirare meglio. A quale dei seguenti quadri clinici corrisponde la descrizione:

| | |
|---|---------------------------|
| A | Scompenso cardiaco |
| B | Ipertensione arteriosa |
| C | Polmonite |
| D | Asma bronchiale |

Domanda 6. Quali sono i livelli accettabili di emoglobina glicata nella persona anziana fragile con diabete di lunga durata (>10 anni) e con polipatologie:

| | |
|---|-------------------------------------|
| A | < o uguale a 48mmol/mol (6,5%) |
| B | <53 mmol/mol (7%) |
| C | tra 64-69 mmol/mol (8%-8,5%) |
| D | > 75 mmol/mol (9%) |

Domanda 7. Quali sono gli elementi che definiscono il campo di attività e la responsabilità dell'infermiere:

| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A | Profilo professionale, formazione di base e post base, codice deontologico |
| B | Profilo professionale, formazione di base e formazione continua |
| C | Profilo professionale ed esperienza conseguita sul campo |
| D | Profilo professionale e codice deontologico |

Domanda 8. L'insulina ultrarapida Novorapid (insulina Aspart) ha la seguente proprietà:

| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Inizia ad agire riducendo la glicemia dopo 30 minuti dall'esecuzione e quindi è necessario eseguire |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---|---------------------------------------------------------|
| | la sottocutanea 30 minuti prima del pasto |
| B | Raggiunge il picco massimo dopo 5 ore dopo l'esecuzione |
| C | Agisce da 10 minuti a 20 minuti dall'esecuzione |
| D | Mantiene la sua azione per 6-8 ore |

Domanda 9. Quale di queste scale sceglierebbe per la valutazione del dolore nella persona con deficit cognitivo moderato-severo:

| | |
|---|------------------------|
| A | Indice di Barthel |
| B | Faces Pain Scale |
| C | Numerical Rating Scale |
| D | Scala PAINAD |

Domanda 10. Per il riutilizzo della controcannula tracheostomica è previsto un trattamento igienico del presidio che prevede:

| | |
|---|-------------------------------------|
| A | Sterilizzazione 121°C |
| B | Disinfezione ad alto livello |
| C | Detersione |
| D | Decontaminazione |

Domanda 11. I cinque momenti fondamentali per l'igiene delle mani atti ad interrompere la catena di trasmissione dei microrganismi tra le persone prevedono un ordine ben preciso (WHO, 2009). Individui l'affermazione che ha l'ordine corretto:

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Prima del contatto del paziente, dopo esposizione ad un liquido biologico, prima di una manovra asettica, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente |
| B | Prima del contatto del paziente, dopo esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente |
| C | Prima del contatto del paziente, dopo il contatto con il paziente, dopo esposizione ad un liquido biologico, prima di una manovra asettica, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente |
| D | Prima del contatto del paziente, prima di una manovra asettica, dopo esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente |

Domanda 12. Quale tra i seguenti aspetti costituisce uno dei criteri fondamentali nella decisione di trattare un sintomo correlato a cancro in fase avanzata?

| | |
|---|-------------------------------------------------------|
| A | L'attendibilità dell'utente nel descrivere il sintomo |
| B | L'aspettativa di vita dell'utente |
| C | Alterazioni dell'esame di laboratorio |
| D | Impatto del sintomo sulla vita dell'utente |

Domanda 13. Un residente in terapia antibiotica per infezione delle vie urinarie molto agitato alle ore 2,00 tenta di scavalcare le spondine, affermando che quella non è la sua casa e che non capisce come è arrivato là; riferisce che lo hanno imprigionato perché ci sono delle persone nella sua stanza che parlano contro di lui. Nonostante gli interventi di rassicurazione e riorientamento l'utente appare ancora più agitato e vuole assolutamente uscire dalla struttura. L'infermiere allora decide di telefonare alla guardia medica e mentre riporta i dati parla al medico di:

| | |
|---|------------------------------|
| A | Delirium |
| B | Allucinazioni |
| C | Agitazione psicomotoria |
| D | Disorientamento tempo-spazio |

Domanda 14. Indica quale affermazione è corretta rispetto all'impiego dell'ipodermoclisi:

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| A | Si può introdurre in ogni sito massimo 2 litri nelle 24 ore |
| B | La sede preferenziale per effettuare l'ipodermoclisi è la zona del basso addome |
| C | Negli anziani confusi l'ipodermoclisi è meno tollerata rispetto alla via venosa |
| D | Può essere infusa in ipodermoclisi la soluzione glucosata 5% |

Domanda 15. L'infermiere prima di decidere di attribuire un compito all'OSS deve procedere alle seguenti valutazioni:

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Determinare le condizioni dell'utente, definire la complessità dell'attività da eseguire, verificare le competenze dell'OSS |
| B | Determinare le condizioni dell'utente, definire la complessità dell'attività da eseguire, verificare gli anni di attività lavorativa |
| C | Determinare le condizioni dell'utente, definire la complessità dell'attività da eseguire, verificare le aree in cui ha prestato servizio precedentemente |
| D | Determinare le condizioni dell'utente, definire la complessità dell'attività da eseguire, provvedere ad una gradualità dell'attribuzione del compito |

Domanda 16. Quali osservazioni attua l'infermiere durante l'aspirazione delle secrezioni bronchiali attraverso cannula tracheostomica?

| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Controllo colorito cutaneo, il livello di discomfort dell'utente, la frequenza respiratoria |
| B | Controllo colorito cutaneo, il livello di discomfort dell'utente, presenza di febbre |
| C | Controllo del colorito cutaneo, il livello di discomfort dell'utente, le caratteristiche delle secrezioni |
| D | Le caratteristiche delle secrezioni, il colorito cutaneo, lo stato cognitivo |

Domanda 17. Quanto tempo è necessario attendere prima di estrarre l'ago dal sito di iniezione dopo avere praticato l'insulina con "la penna" ?

| | |
|---|-------------------|
| A | 10 secondi |
| B | 3 secondi |
| C | 5 secondi |
| D | 0 secondi |

Domanda 18. Nel processo di gestione del farmaco quale attività di quelle sottoelencate può effettuare l'OSS con supervisione dell'infermiere?

| | |
|---|-------------------------------------|
| A | Esecuzione terapia sottocutanea |
| B | Preparazione delle soluzioni per os |
| C | Somministrazione della terapia |
| D | Nessuna delle precedenti |

Domanda 19. Nella sanificazione della stanza di degenza di un paziente con infezione da Clostridium difficile, si devono utilizzare:

| | |
|---|-----------------------------------------------|
| A | Prodotti a base di polifenoli |
| B | Prodotti a base di ipoclorito di sodio |
| C | Prodotti disinfettanti a base di iodopovidone |
| D | Prodotti a base di ammoni quaternari |

Domanda 20. Tra le fasi di elaborazione del lutto, secondo Elisabeth Kubler-Ross, ci sono:

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| A | La fase di negazione, la fase di allentamento/restringimento |
| B | La fase di negazione, la fase di rabbia, la fase di patteggiamento |
| C | La fase di ansia, la fase di riorientamento, la fase di accettazione |
| D | La fase di ansia, la fase del senso di colpa, la fase del perdono |

Domanda 21. Nella comunicazione con l'anziano con demenza è importante che:

| | |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| A | La persona sia corretta in eventuali suoi errori di linguaggio |
| B | Mantenimento di una coerenza tra parole e linguaggio non verbale |
| C | Utilizzo di un atteggiamento autorevole e deciso |
| D | Utilizzo di un linguaggio autoritario e direttivo |

Domanda 22. Il paziente con disfagia può incorrere nelle seguenti complicanze:

| | |
|---|-------------------------------------------------------------|
| A | Malnutrizione, disidratazione, polmonite ab ingestis |
|---|-------------------------------------------------------------|

| | |
|---|--------------------------------------------|
| B | Malnutrizione, disidratazione e diarrea |
| C | Malnutrizione, disidratazione, iponatremia |
| D | Alterazioni elettrolitiche |

Domanda 23. L'assorbimento intestinale del calcio nell'anziano è:

| | |
|---|---------------------------------------------------|
| A | Aumentato |
| B | Aumentato gradualmente in base all'età |
| C | Ridotto solo in caso di infiammazione intestinale |
| D | Generalmente ridotto |

Domanda 24. Il farmaco di prima scelta nel trattamento del breakthrough pain nel paziente oncologico è:

| | |
|---|-------------------------------------------|
| A | Ossicodone a rilascio prolungato |
| B | Fans |
| C | Morfina a immediato rilascio orale |
| D | Paracetamolo |

Domanda 25. Il termine emiplegia indica:

| | |
|---|---------------------------------------------------|
| A | La perdita di sensibilità di un emisoma |
| B | La perdita della motilità di un emisoma |
| C | La perdita della visione in metà del campo visivo |
| D | Nessuna delle precedenti |

Domanda 26. Un paziente adulto si definisce oligurico quando:

| | |
|---|--------------------------------------------------|
| A | La diuresi giornaliera è minore di 800 ml |
| B | La diuresi oraria è 2 ml/kg |
| C | La diuresi giornaliera è minore di 500 ml |
| D | La diuresi giornaliera è minore di 100 ml |

Domanda 27. Il bruxismo è:

| | |
|---|---------------------------------------------------------------|
| A | Un muscolo appartenente alla muscolatura mimica |
| B | Un attacco di tetania localizzato |
| C | Una contrazione serrata della bocca |
| D | Un movimento ripetuto di masticazione durante il sonno |

Domanda 28. Secondo il "Codice in materia di protezione dei dati personali" il "titolare" è:

| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | La persona alla quale si riferiscono i dati personali |
| B | La persona che decide le finalità e le modalità del trattamento di dati personali |
| C | La persona che rileva dati personali di altre persone e risponde della correttezza della rilevazione |
| D | La persona che ha la responsabilità della conservazione dei dati personali |

Domanda 29. Obiettivo del gestire la complessità familiare nella relazione di cura dell'anziano ammalato è:

| | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A | La riduzione del conflitto familiare |
| B | L'evitamento del conflitto |
| C | Supportare la famiglia nella ricerca del proprio modo di vivere il fine vita |
| D | Tutelare il clima di benessere dell'equipe di cura. |

Domanda 30. La qualità di vita della famiglia:

| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | È indipendente dallo stato di progressione della malattia della persona anziana istituzionalizzata |
| B | È secondaria rispetto a quella della persona anziana istituzionalizzata, protagonista della presa in carico socio sanitaria |
| C | È fortemente connessa a quella della persona anziana istituzionalizzata |

| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| D | È importante venga valutata per ridurre il rischio di stress per l'equipe di cura |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|

Domanda 31. Quale comportamento può sostenere maggiormente un residente nel suo processo di adattamento psicologico alla perdita di autonomia per il suo stato di malattia?

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| A | Valorizzazione dell'autodeterminazione e delle sue capacità residue |
| B | Pianificazione di ulteriori momenti di socialità |
| C | Rinforzo della speranza di ripresa delle autonomie |
| D | Incremento di attività fisioterapica |

Domanda 32. La sofferenza della persona anziana:

| | |
|---|--------------------------------------------------------|
| A | È un'esperienza monodimensionale |
| B | Nel fine vita diventa normale |
| C | È sempre presente in anziani con dolore cronico |
| D | Tutte le precedenti |

Domanda 33. Che cosa s'intende per dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)?

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | È la possibilità per il paziente di esprimere in forma scritta la propria visione di vita, i valori, i desideri e i limiti nei confronti delle cure possibili |
| B | È la possibilità per il paziente di esprimere al medico la propria visione di vita, i valori, i desideri e i limiti nei confronti delle cure possibili |
| C | Si tratta di una dichiarazione verbale del paziente rispetto alle sue volontà |
| D | Nessuna risposta esatta |

Domanda 34. Le vie di somministrazione di farmaci attraverso la pompa elastomerica possono essere:

| | |
|---|--------------------------------------|
| A | Via orale |
| B | Tutte le vie |
| C | Via venosa e via sottocutanea |
| D | Via venosa |

Domanda 35. Vomito, dolore e distensione addominale, alvo chiuso a feci e gas, sono segni e sintomi di:

| | |
|---|-------------------------------|
| A | Occlusione intestinale |
| B | Pancreatite acuta |
| C | Tutte le precedenti |
| D | Colecistite |

Domanda 36. Che cosa è la Scala di Push?

| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Uno strumento che permette la valutazione del rischio delle ulcere da pressione |
| B | È uno strumento che permette la valutazione degli interventi volti alla prevenzione |
| C | È uno strumento che serve a monitorare dimensioni e caratteristiche delle ulcere da pressione |
| D | È uno strumento per la misurazione dell'intensità dolore |

Domanda 37. Durante l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso, la vena prescelta va punta:

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Mettendo l'ago in linea rispetto alla vena con un'angolazione di circa 60 gradi |
| B | Mettendo l'ago in linea rispetto alla vena con un'angolazione di circa 45 gradi |
| C | Mettendo l'ago in linea rispetto alla vena con un'angolazione di circa 30 gradi |
| D | Mettendo l'ago in linea rispetto alla vena con un'angolazione di circa 120 gradi |

Domanda 38. Il consenso informato è:

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | La manifestazione di volontà con cui un soggetto accetta/rifiuta di essere sottoposto ad un trattamento o, comunque, ad un atto medico, nonché di essere informato dai curanti sulla sua condizione clinica e sugli interventi diagnostico- terapeutici praticabili |
| B | La manifestazione di volontà con cui esclusivamente il familiare accetta /rifiuta di sottoporre il proprio caro ad un trattamento o, comunque, ad un atto medico |

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C | La manifestazione di volontà con cui un soggetto e la famiglia, solo in accordo, accettano/rifiutano un trattamento o, comunque, ad un atto medico, nonché di essere informati dai curanti sullo stato di malattia e sugli interventi diagnostico- terapeutici praticabili |
| D | La manifestazione di volontà con cui un soggetto accetta/rifiuta di essere sottoposto ad un trattamento o, comunque, ad un atto medico, nonché di essere informato dai curanti su diagnosi e prognosi, previo benessere del familiare di riferimento |

Domanda 39. Le conversazioni di fine vita sono:

| | |
|---|------------------------------------------------------------|
| A | Colloqui di comunicazione della prognosi infausta |
| B | Colloqui sul tema della spiritualità della persona morente |
| C | Dialoghi sull'esperienza del morire |
| D | Dialoghi su temi inerenti testamento ed eredità |

Domanda 40. Nella promozione di un buon clima di equipe di lavoro interdisciplinare è importante:

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Dare la priorità alla condivisione delle dinamiche affettive e relazionali tra i componenti |
| B | Allontanare i componenti con modalità relazionali disfunzionali |
| C | Evidenziare i bisogni personali dei vari membri |
| D | Condividere obiettivi e metodi di lavoro |

Domanda 41. Nel processo di adattamento psicologico alla malattia di un anziano con demenza, il familiare può vivere alcune tappe evidenziate dalla letteratura:

| | |
|---|--------------------------------------------|
| A | Rabbia e negazione |
| B | Senso di colpa e assenteismo assistenziale |
| C | Assenteismo assistenziale e direttività |
| D | Negazione e ipercontrollo |

Domanda 42. Nella presa in carico della famiglia è importante:

| | |
|---|---------------------------------------------------------------|
| A | Il rilevamento del componente più disfunzionale |
| B | L'individuazione dei membri più ostili verso l'equipe di cura |
| C | L'accoglienza dei bisogni e della storia familiare |
| D | La strutturazione di strategie di riduzione del conflitto |

Domanda 43. Quali sono le caratteristiche definenti della diagnosi infermieristica "diarrea"?

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| A | Aumentata frequenza delle evacuazioni superiore a 5 volte al giorno |
| B | Aumentata frequenza delle evacuazioni superiore a 3 volte al giorno |
| C | Aumentata frequenza delle evacuazioni e assenza di borborigmi |
| D | Aumentata frequenza delle evacuazioni con emissione di feci non formate |

Domanda 44. L'igiene della mani, secondo le linee guida OMS del 2009, effettuata con frizione idroalcolica per essere efficace deve durare?

| | |
|---|-------------------------------------------|
| A | Il tempo non è un indicatore di efficacia |
| B | Non deve durare meno di 20 secondi |
| C | Non deve durare meno di 10 secondi |
| D | Non deve durare meno di 15 secondi |

Domanda 45. Quale comportamento può essere utile verso un anziano con deterioramento cognitivo che chiede ripetutamente di "tornare a casa"?

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| A | Somministrare subito la terapia ansiolitica |
| B | Sollecitare la famiglia ad una presenza più assidua |
| C | Ragionare e spiegare alla persona l'impossibilità del rientro a casa |
| D | Rassicurare e confortare con un tono calmo e pacato |

Domanda 46. Il morire per la persona anziana:

| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | È un processo in cui la persona anziana mantiene sempre lo stesso ruolo e la stessa interpretazione |
| B | È un fatto di vita da nascondere ed evitare |
| C | È una prospettiva che muove a tutti emozioni di tristezza e angoscia |
| D | È un processo in cui la persona anziana attribuisce un senso che può cambiare continuamente |

Domanda 47. Nella relazione di cura con l'anziano sofferente:

| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | L'infermiere porta inevitabilmente anche il proprio vissuto personale |
| B | L'infermiere deve sempre accantonare il proprio vissuto emozionale per essere utile all'altro |
| C | L'infermiere porta il suo vissuto prettamente professionale |
| D | L'infermiere agisce in base al buon senso |

Domanda 48. Per artrocentesi s'intende:

| | |
|---|-------------------------------------------------------------|
| A | L'aspirazione del midollo osseo da una cavità articolare |
| B | Un prelievo ematico da una cavità articolare |
| C | Un indagine radiologica di una articolazione |
| D | L'aspirazione di un liquido da una cavità articolare |

Domanda 49. Indica quale residente di una RSA tra quelli citati è più a rischio di caduta?

| | |
|---|-------------------------------------------------------|
| A | Persona deambulante con febbre |
| B | Persona affetta da demenza con Barthel mobilità 10/40 |
| C | Persona deambulante e lucida |
| D | Delirium ipocinetico |

Domanda 50. L'infermiere si reca al letto dell'utente per eseguire la medicazione su un'ulcera da pressione a livello del trocantere di stadio III di dimensioni 3cmx3cm. Rimossa la medicazione precedente l'infermiera osserva la ferita e trova le seguenti caratteristiche: tessuto di granulazione presente con assenza di fibrina, essudato sieroso-ematico abbondante, bordi della lesione arrossati e medicazione precedente molto intrisa di essudato. Quale tipo di medicazione avanzata l'infermiere decide di adottare?

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Alginato di calcio e successiva medicazione secondaria con garza sterile e cerotto di fissaggio |
| B | Idrocolloidale in placca |
| C | Antisettico in soluzione o garza con antisettico e con medicazione secondaria con garza sterile con cerotto di fissaggio |
| D | Idrogel e come medicazione secondaria garza sterile con cerotto per fissaggio |

Domanda 51. L'infermiere ad ore 16 deve somministrare 1 cp di Lansox orodispersibile alla signora Angela portatrice di sonda PEG. Si accorge che la sonda è ostruita, come si comporta:

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Preme delicatamente il tubo tra indice e pollice, lava con acqua tiepida e sodio bicarbonato ed usa lo spazzolino. |
| B | Preme delicatamente il tubo tra indice e pollice, lava con acqua tiepida ed usa lo spazzolino |
| C | Preme delicatamente il tubo tra indice e pollice, lava con 20cc di bevanda gasata ed usa lo spazzolino |
| D | Avvisa il medico e si attiva per l'invio del residente presso l'U.O. di Gastroenterologia per la disostruzione |

Domanda 52. Quale di queste affermazioni è corretta sulla gestione del catetere vescicale a permanenza:

| | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Per prevenire le infezioni delle vie urinarie in utente con catetere vescicale è importante eseguire un esame microbiologico delle urine regolarmente |
| B | Il catetere vescicale a permanenza va sostituito a scadenze fisse |
| C | Il catetere vescicale a permanenza va sostituito valutando anche le caratteristiche delle urine |
| D | Prima della rimozione del catetere vescicale a permanenza va eseguita la ginnastica vescicale |

Domanda 53. Nel relazionarsi con un paziente/ospite in fase terminale:

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| A | In ogni caso, va sempre tenuto un atteggiamento distaccato |
| B | In generale, vanno rispettati i valori e le credenze del paziente/ospite |

| | |
|---|-----------------------------------------------------------|
| C | In ogni caso, va sempre tenuto un atteggiamento amicale |
| D | Bisogna relazionarsi secondo le indicazioni dei familiari |

Domanda 54. Il modello SMART prevede di definire un obiettivo di equipe attraverso le seguenti caratteristiche:

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| A | Specifico, misurabile, attuabile, realistico, tempo definito |
| B | Specifico, misurabile, approvabile, riproponibile, tempestivo |
| C | Specifico, modificabile, ampio, riproponibile, tempestivo |
| D | Specifico, modificabile, agente, rilevante, tempo definito |

Domanda 55. Quale non rappresenta una complicanza dell'allettamento nell'anziano:

| | |
|---|-------------------------|
| A | Ulcere da pressione |
| B | Ipocalcemia |
| C | Fecalomi |
| D | Nessuna risposta esatta |

Domanda 56. Cosa si intende per "Valutazione Multidimensionale" dell'anziano:

| | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Anamnesi accurata ed esame clinico |
| B | Esame obiettivo |
| C | Anamnesi accurata |
| D | Metodologia diagnostica che considera i diversi determinanti dello stato di salute |

Domanda 57. Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti l'assistenza alla persona portatrice di catetere vescicale a permanenza è assolutamente errata:

| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | La sacca di drenaggio va sostituita in concomitanza con la sostituzione del catetere vescicale |
| B | Utilizzare un catetere di dimensione più piccola possibile compatibilmente con un adeguato drenaggio |
| C | L'igiene quotidiana del meato urinario deve essere praticata con acqua e clorexidina |
| D | In presenza di ostruzione del catetere vescicale è preferibile la sua sostituzione alla tecnica dell'irrigazione |

Domanda 58. Nel controllo del ristagno gastrico durante la somministrazione della nutrizione enterale tramite PEG iniziata da circa 1 mese, l'infermiere aspira una quantità di liquido pari a 150ml. Come si deve procedere?

| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Si reintroduce il liquido aspirato nella sonda gastrostomica, si applica nuovamente la nutrizione enterale e si ricontrolla il ristagno dopo 2-4 ore a seconda delle condizioni del residente |
| B | Si reintroduce il liquido aspirato nella sonda gastrostomica e si sospende la nutrizione enterale per 4 ore |
| C | Si reintroduce il liquido aspirato nella sonda gastrostomica e si posiziona il residente semiseduto per favorire il transito intestinale |
| D | Si reintroduce il liquido aspirato nella sonda gastrostomica e si sospende la nutrizione enterale, applicando solo l'acqua |

Domanda 59. I guanti in vinile non sterili sono indicati:

| | |
|---|-------------------------------------------|
| A | Nella rimozione di linee infusive |
| B | Nel praticare l'insulinoterapia |
| C | Nel praticare un'iniezione intramuscolare |
| D | Nel vestire l'utente |

Domanda 60. L'ipodermoclisi è indicata:

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| A | In persone che necessitano di soluzioni ipertoniche a bassa velocità |
| B | In persone che necessitano di terapia antalgica ad orario |
| C | In persone con disidratazione di grado lieve-moderata |
| D | Per tutte le soluzioni che potrebbero essere infuse per via venosa |