

TEMA 2

1. **Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 il titolare del trattamento dei dati in una A.P.S.P. è:**
 - a. L'Azienda
 - b. Il Presidente dell'Azienda
 - c. Il Direttore dell'Azienda
 - d. Il Funzionario Responsabile
2. **Considerato quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679, quale delle seguenti proposizioni è corretta:**
 - a. Non è mai consentito trattare dati personali senza aver prima acquisito il consenso dell'interessato
 - b. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il trattamento dei dati personali è lecito anche senza acquisire il consenso dell'interessato
 - c. Il trattamento dei dati personali che non rientrano tra le "categorie particolari" è consentito a qualsiasi persona giuridica indipendentemente dal consenso dell'interessato
 - d. Nessuna delle precedenti
3. **Che cosa si intende per delirium?**
 - a. Stato di confusione mentale ad insorgenza acuta, con decorso fluttuante, di breve durata, dovuto a cause organiche, caratterizzato dalla presenza di disturbi dell'attenzione, della coscienza, del pensiero e della memoria
 - b. E' una patologia ad esordio improvviso caratterizzato da uno stato di confusione mentale con decorso ingravescente
 - c. Entrambe le risposte precedenti
 - d. Nessuna risposta esatta
4. **Quale delle seguenti Scale per la rilevazione del dolore è più appropriata per le persone con gravi disturbi cognitivi:**
 - a. PAINAD
 - b. VAS
 - c. NRS
 - d. nessuna delle precedenti
5. **L'indice di massa corporea, BMI, si misura:**
 - a. $\text{Peso (kg)} / \text{altezza al quadrato, (m}^2\text{)}$
 - b. $\text{Altezza al quadrato (m}^2\text{)} / \text{peso (kg)}$
 - c. $\text{Peso al quadrato (kg}^2\text{)} / \text{altezza (m)}$
 - d. $\text{Peso (kg)} \text{ per altezza (m)} / \text{altezza al quadrato}$
6. **In una persona con diarrea è prioritario:**
 - a. Integrare alimenti ricchi di zuccheri
 - b. Integrare i liquidi
 - c. Richiedere una dieta iperproteica
 - d. Introdurre alimenti ricchi di fibre

7. Nel paziente affetto da demenza quale deficit determina una sua peculiarità?

- a. Deficit di memoria
- b. Deficit dell'equilibrio
- c. Deficit visivo
- d. Tutte le risposte sono errate

8. Il quinto parametro/segno vitale è:

- a. Pressione Venosa Centrale
- b. Ematocrito
- c. Dolore
- d. Sudorazione

9. Legge 38/2010: chi ha diritto alle Cure Palliative e alla Terapia del Dolore:

- a. Solamente persone indigenti
- b. Solamente persone affette da diabete
- c. Solamente persone con patologia oncologica
- d. Tutti i cittadini

10. Con il termine ascite si intende:

- a. Una raccolta di liquido nelle articolazioni
- b. Una raccolta di liquidi nella cavità peritoneale
- c. Una raccolta di liquidi nella cavità toracica
- d. Tutte le precedenti

11. Quali tra queste rappresenta una categoria di farmaci anticoagulanti

- a. EBPM (eparina basso peso molecolare)
- b. Antiaggreganti e antipsicotici
- c. Antidiabetici
- d. Tutte le risposte sono errate

12. Il paziente con disfagia può incorrere nelle seguenti complicanze

- a. Malnutrizione, disidratazione e diarrea
- b. Malnutrizione, disidratazione, iponatremia
- c. Malnutrizione, disidratazione, polmonite ab ingestis
- d. Tutte le risposte sono esatte

13. Quale non rappresenta una complicanza dell'allettamento nell'anziano

- a. Ipocalcemia
- b. Piaghe da decubito
- c. Fecalomi
- d. Nessuna risposta esatta

14. I sintomi caratteristici dell'ipoglicemia non sono:

- a. Sudorazione, fame, tremore
- b. Ipertermia e diarrea

- c. Polso frequente, vista sfocata o sdoppiata, debolezza
- d. Nessuna delle precedenti

15. Un paziente adulto si definisce oligurico quando:

- a. La diuresi giornaliera è minore di 800 ml
- b. La diuresi giornaliera è maggiore di 1000 ml
- c. La diuresi giornaliera è minore di 100 ml
- d. La diuresi giornaliera è minore di 500 ml

16. Un residente affetto da demenza di livello moderato ha difficoltà a bere e tossisce all'assunzione dei liquidi quali informazioni fornirà l'infermiere?

- a. Capo rivolto all'indietro, addensare i liquidi preferiti, utilizzare un bicchiere adattato riempito in minima parte
- b. Capo rivolto in avanti, preferire spremute o succhi di frutta concentrati, può utilizzare una cannuccia
- c. Capo rivolto in avanti, addensare i liquidi preferiti, utilizzare un bicchiere adattato riempito almeno per tre quarti
- d. Capo eretto e allineato, utilizzare uno schizzettone da posizionare a lato della bocca somministrando piccole dosi di liquido

17. La scelta dei dispositivi di protezione individuale è basata su:

- a. Tipi di contatto con il residente e sulla rilevanza epidemiologica della malattia
- b. Tipi di contatto con il residente e sulla possibile modalità di trasmissione
- c. Immunità del residente e sulla modalità di trasmissione
- d. Immunità del residente e sulla rilevanza epidemiologica della malattia

18. Il signor Mario è risvegliabile solo alla stimolazione dolorosa e non risponde allo stimolo verbale. Terminata la stimolazione Mario ricade nel proprio stato di non risvegliabilità. Lo stato di Mario si può definire:

- a. Coma
- b. Confuso
- c. Stuporoso
- d. dormiveglia

19. Quanti tipi di shock conosci:

- a. Shock traumatico
- b. Shock neurogeno – cardiogeno
- c. Shock traumatico- cardiogeno- neurogeno- ipovolemico
- d. Shock anafilattico- cardiogeno- ipovolemico- neurogeno- settico

20. La conseguenza immediata di uno pneumotorace è:

- a. Atelettasia polmonare
- b. Collasso polmonare
- c. Insufficienza respiratoria di tipo ostruttivo
- d. aumento delle secrezioni bronchiali

Domande aperte

1. **Lesioni da pressione in RSA: quali sono le persone a rischio, sedi a rischio, stadi, misure preventive.**
2. **Dolore: riferimenti normativi, scale di valutazione e caratteristiche del dolore.**